

**TRIAMCINOLONA acetónido 0.5% y LIDOCAÍNA 1%**  
**en Gel adhesivo oral.**

Triamcinolona acetónido 0,5% y Lidocaína 1%  
en Gel adhesivo oral

Triamcinolona acetónido	0,15 g
Lidocaína clorhidrato	0,3 g
Glicerol	2 g
Excipiente adhesivo oral, csp	30 g

Conservación: Protegido del aire y de la luz.

Caducidad: 1 mes.

Administración: Tópica mucosa bucal.

**Descripción**

La Triamcinolona es un potente glucocorticoide con efecto antiinflamatorio, antialérgico y antirreumático; la Lidocaína es un anestésico local.

**Indicaciones**

Afecciones de la mucosa oral que cursan con inflamación y dolor.

**Posología y Forma de Administración**

Según prescripción. Lo usual es 2-3 aplicaciones al día.

Se administra colocando una pequeña cantidad de gel sobre el área a tratar, pudiendo emplearse una varilla como aplicador.

**Precaución y Contraindicaciones**

No es conveniente aplicarlo justo antes de ingerir alimentos o bebidas.

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

Precaución durante el embarazo y lactancia.

Contraindicado en casos de alergia a anestésicos locales tipo amida, aunque existe riesgo de alergia cruzada con otros anestésicos.

No es recomendable su empleo sobre áreas infectadas. Contraindicado durante embarazo y lactancia.

Respetar estrictamente la pauta posológica y la duración del tratamiento establecidas.

**Efectos secundarios:**

Debido a la pequeña cantidad aplicada no es probable que se produzcan efectos secundarios a nivel sistémico.

A nivel local pueden producir irritaciones, prurito y eczemas de contacto.

El uso de corticoide puede favorecer el desarrollo microbiano.

**Bibliografía**

Asociación de Formelistas de Andalucía [en línea]. 2010 [fecha de acceso 26 de mayo de 2014]. URL disponible en: <http://www.formulistasdeandalucia.es/noticia.php?id=103>